

Pancreatitis crònica con exacerbación aguda: Se observa una masa inflamatoria que estenosa la segunda porción del duodeno y causa especulación y edema acentuado

**Tipo de examen:** Tránsito Intestinal

*Incidencia:* Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico, el píloro, el bulbo duodenal, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno, las vértebras lumbares (LI y LII).




**Seudoquiste Pancreático**: Existe estenosis de la segunda porción del duodeno con ampliación del maco duodenal, pero en este caso los pliegues mucosos están intactos.

**Tipo de examen:** Tránsito Intestinal

*Incidencia:* Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico, el píloro, el bulbo duodenal, el duodeno, el yeyuno, el íleon, las vértebras torácicas (T10-T12) y lumbares (LI – LIII).



#### Hematoma duodenal intramural:

Lesión estenótica de grado alto producto de la formación de un hematoma por traumatismo abdominal (Imagen radiológica de un niño)

Tipo de examen: Tránsito Intestinal

Incidencia: Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: El píloro, el bulbo duodenal, la primera y segunda porción del duodeno(Invadido por el hematoma) y las vértebras lumbares que difícilmente son apreciables.




Carcinoma del páncreas: Que produce una lesión constrictiva anular. El aspecto radiológico es indistinguible de un carcinoma duodenal primario

**Tipo de examen:** Tránsito Intestinal

Incidencia: Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico; el píloro; el bulbo duodenal, la primera, segunda y tercera porción del duodeno, las vértebras lumbares que con dificultad se observan en la parte posterior.



<u>Sindrome de la arteria mesentérica</u> <u>superior:</u> Se presenta en la esclerodermia. Existen atonía y dilatación importante del duodeno proximal al ángulo aórticomesenterico

Tipo de examen: Tránsito Intestinal

Incidencia: Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: la primera, segunda y tercera porción del duodeno (dilatadas), arteria aórticomesenterica; los cuerpos, apófisis transversas y pedículos de las vértebras lumbares.