

DEFECTOS DE REPLECCIÓN FOCALES EN YEYUNO E ILEON

Paola León Jacinto


HEMANGIOMAS



Figura 1. Tránsito gastrointestinal: divertículo a nivel del ángulo de Treitz. Yeyuno distendido hasta su porción distal con estenosis a ese nivel.

- Habitualmente múltiples, pero pequeño y con frecuencia inadvertido en estudios con bario.
- Presentación clínica más frecuente es la anemia crónica secundaria a sangrado gastrointestinal.
-

LINFOMA



- Masa polipoide, con frecuencia grande y voluminosa con ulceraciones irregulares.
- Puede aparecer masas grandes o pequeñas múltiples.

SINDROME DE POLIPOSIS



FIG. GI36-11. **Síndrome de Gardner.** Los innumerables pólipos adenomatosos diseminados por el colon presentan un aspecto radiológico indistinguible del de la poliposis familiar.

- Defectos múltiples asociados a tumores del colon e incluso gástricos.
- En el Sind. De Gardner los polipos adenomatosos se asocian con osteomas y tumores de tejido blando.

PARÁSITOS



Fig. GG2-4. Leishmaniasis. Con lesión regular terminal.




Fig. GG2-5. Tumor cecaloides ileocecal.



Fig. GG2-6. Anillo lameliforme en los repliegues con lesión tipo defecto de plicosis nodulobulbosa (GGP-5).

- Defectos intraluminales lineales múltiples.
- La mayoría de las veces *Ascaris lumbricoide*.
- Otros parásitos comprenden: *Strongyloides stercoralis*, *Ancylostoma duodenale* y *Taenia solis*.

METÁSTASIS



- Defectos de replección múltiple muchas veces con ulceración central.
- La mayoría de las veces se deben a melanomas y carcinoma.
- Otros comprenden sarcoma de kaposi y neoplasias primarias de ovarios, páncreas, riñón, estómago, útero.