

DEFECTOS DE REPLECION DUODENALES



HIPERPLASIA DE GLÁNDULAS DE BRUNNER

respuesta reactiva de la mucosa duodenal a la enfermedad ulcerosa péptica. La secreción alcalina de las glándulas de Brunner es rica en mucus y bicarbonato, que protegen a la mucosa duodenal de la erosión del ácido gástrico. Múltiples defectos de relleno nodulares primariamente en el bulbo y en la mitad proximal de la segunda porción. Puede presentarse como un defecto único relativamente grande (adenoma de las glándulas de Brunner).

Tipo de examen: Tránsito Intestinal **Incidencia:** Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico, el píloro, el bulbo duodenal, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno, las vértebras lumbares(LI y LII).



HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE

en adultos, asociada a una deficiencia de inmunoglobulinas, con mayor susceptibilidad a las infecciones. Puede demostrarse infección por *Giardia Lamblia* en el 90% de los pacientes. Produce diarrea y malabsorción. Innumerables defectos de relleno afectan primariamente al yeyuno pero pueden estar distribuidos regularmente por todo el ID.

Tipo de examen: Tránsito Intestinal

Incidencia: Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico, el píloro, el bulbo duodenal, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno,

COLEDOCOCELE – TRANSITO INTESITINAL CON BARIO

El coledococoele pertenece al tipo III de los quistes biliares según la clasificación de Alonso-Lej, y son considerados los quistes menos frecuentes entre ellos. La definición habitual del coledococoele es la de una dilatación quística de la porción distal intramural del colédoco que protruye en la luz duodenal.



SEUDOQUISTE PANCREATICO

Es la acumulación de tejido, líquido, residuos, enzimas pancreáticas y sangre que se puede desarrollar después de una [pancreatitis aguda](#)


Los pseudoquistes pancreáticos se desarrollan usualmente después de un episodio de pancreatitis aguda grave y con frecuencia ocurren cuando los conductos pancreáticos se rompen debido a la inflamación que se presenta durante la pancreatitis.

Se observa una repleción intramural.

Tipo de examen: Tránsito Intestinal

Incidencia: Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico, el píloro, el bulbo duodenal, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno, las vértebras lumbares(LI y LII).



VARICES DUODENALES

Las varices duodenales se desarrollan en pacientes sometidos a escleroterapia y con carcinoma hepatocelular, presentando una tasa muy alta de mortalidad. Los betabloqueantes son el tratamiento de elección. El TIPS, la cirugía derivativa y el trasplante deben ser considerados en pacientes sin contraindicaciones.

Tipo de examen: Tránsito Intestinal

Incidencia: Anteroposterior

Estructuras Radiológicas: Se observa el antro pilórico, el píloro, el bulbo duodenal, la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción del duodeno,

